

偏微分方程式の計算数理（共立出版，2023年）

正誤表と補足コメント

齊藤 宣一

<https://norikazu-saito.github.io/p/>

最新更新日：2025年5月31日 (← 2023.10.25)

この文書は、

齊藤宣一『偏微分方程式の計算数理』共立出版

の正誤表です。

本書は、2023年10月25日に初版第1刷が出版されました。その後、2025年5月20日に第2刷が出版され、以下の §3 に挙げた誤植は修正されました。

1 初版第2刷（2025年5月20日）の正誤表

頁/行	訂正前	訂正後	更新日
/			
/			

2 補足コメント

- しばしば，“次のノルムを導入する： $\|\cdot\|^2 = \dots$ ”という表現をしているが、これは、“ $\|\cdot\|^2 = \dots$ ，すなわち， $\|\cdot\| = \sqrt{\dots}$ で定められるノルム $\|\cdot\|$ を考える”という意味である。あまり良い習慣ではないが、しばしば、専門的な論文の中でこのように表現することがある。（2023.10.25, 2023.11.12）

2. 研究課題 2.2 と研究課題 2.3 は、私が学部 4 年生の時に、藤田宏先生から出された課題である。ただし、中川の可変時間刻み幅の技巧を使えとは言われなかつたし、文献も直接は教えてはもらえなかつた。その代わりに、(質問に行った際に) 陳蘊剛、田端正久、俣野博の名前だけ教えてもらった。その後、以下の論文や記事を見つけ、これらが私が初めて読んだ数学の論文となつた。夏休み明けから、冬休みまでかかったと記憶している。幸いなことに、この三人の先生とは、その後長く（現在に至るまで）交流を持てることになつた。

[66] Y. G. Chen. Asymptotic behaviours of blowing-up solutions for finite difference analogue of $u_t = u_{xx} + u^{1+\alpha}$. *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. IA Math.*, Vol. 33, No. 3, pp. 541–574, 1986.

[388] M. Tabata. A finite difference approach to the number of peaks of solutions for semilinear parabolic problems. *J. Math. Soc. Japan*, Vol. 32, No. 1, pp. 171–192, 1980.

[397] 田端正久. もう一つの数値解析—離散問題から連続問題へのフィードバック—. 数値解析と非線型現象（山口昌哉 [編]）, pp. 17–53. 日本評論社, 1996.

[281] H. Matano. Nonincrease of the lap-number of a solution for a one-dimensional semilinear parabolic equation. *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. IA Math.*, Vol. 29, No. 2, pp. 401–441, 1982.

陳先生のことは、今となっては、ご存知ない方が多いかもしれない。

• Y. G. Chen, Y. Giga, and S. Goto, *Uniqueness and existence of viscosity solutions of generalized mean curvature flow equations*, *J. Differential Geom.* Vol. 33, No. 3, pp. 749–786, 1991.

この論文の Chen さんと同一人物である。 (2023.11.02)

3. 定義 4.36 で述べた、多角形領域、多面体領域の定義は、“本書ではこのように扱う”という意味であるので、くれぐれも注意されたい（なので、“多面体とは…”という言い方はしなかつた）。そして、有限要素法の数学理論の分野では、このように解釈されている、と筆者は理解している。 (2023.12.19)

4. 楕円型、放物型という用語を、あまり深く考えずに使つてしまつたと反省しています。あまり良い用語ではないと思うのですが、他にどう言えば良いのか分からなかつたため、惰性で使つてしまひました。 (2023.12.19)

3 初版第 1 刷（2023 年 10 月 25 日）の正誤表

頁/行	訂正前	訂正後	更新日
15 / – 5	となる。	となる。ただし、 $I \in \mathbb{R}^{N \times N}$ は単位行列である。	2023.11.02
36/9 ~ 11	$\mathbf{u}^{n-1+\theta}, \mathbf{u}^{n-1}$	$\mathbf{u}^{(n-1+\theta)}, \mathbf{u}^{(n-1)}$	2023.10.25
36/9	$k\langle A_h \mathbf{u}', A_h \mathbf{u}' \rangle$ (2 つ目の'がボールド体)	$k\langle A_h \mathbf{u}', A_h \mathbf{u}' \rangle$	2023.11.04
68 / – 5	実際に代入することで	代入することで（“実際に”を削除）	2024.04.04

69/11	$0 \leq x \leq x + \varepsilon$	$0 \leq x \leq \varepsilon$	2023.10.25
79/1	$w = w(x)$	$\textcolor{red}{u} = u(x)$	2023.11.09
79/2	$J(w) = \int_0^L G(w, \partial_x w) dx$	$J(\textcolor{red}{u}) = \int_0^L G(\textcolor{red}{u}, \partial_x \textcolor{red}{u}) dx$	2023.11.09
97/-5	$G\mathbf{u}^{(n-1)} - i\tau H^{-1} [(1-\theta)\mathbf{f}(\mathbf{u}^{(n-1)}) + \theta\mathbf{f}(\mathbf{u}) + \mathbf{g}^{(n-1+\theta)}]$	$G\textcolor{red}{u} - i\tau H^{-1} [(1-\theta)\mathbf{f}(\textcolor{red}{u}) + \theta\mathbf{f}(\mathbf{u}) + \mathbf{g}^{(n-1+\theta)}]$ (2箇所の(n-1)を削除)	2023.12.13
97/-3	確かめられる.	確かめられる. ただし, $\mathcal{F}(\mathbf{u})$ は, (2.51) で定めたものである. (2.52) も見よ.	2023.12.13
98/3	$\ \mathbf{u}^{(n-1)}\ + \tau(1-\theta)\ \mathbf{f}(\mathbf{u}^{(n-1)})\ + \tau\theta\ \mathbf{f}(\mathbf{u})\ + \tau R$	$\ \textcolor{red}{u}\ + \tau(1-\theta)\ \mathbf{f}(\textcolor{red}{u})\ + \tau\theta\ \mathbf{f}(\mathbf{u})\ + \tau R$ (2箇所の(n-1)を削除)	2023.12.13
98/4	$\ \mathbf{u}^{(n-1)}\ + \tau(1-\theta)C_{1f}(\ \mathbf{u}^{(n-1)}\) + \tau\theta C_{1f}(\ \mathbf{u}\) + \tau R$	$\ \textcolor{red}{u}\ + \tau(1-\theta)C_{1f}(\ \textcolor{red}{u}\) + \tau\theta C_{1f}(\ \mathbf{u}\) + \tau R$ (2箇所の(n-1)を削除)	2023.12.13
140/13, 15, 16	$\ B\ $ (3箇所)	$\ \textcolor{red}{E}\ $ (3箇所)	2023.11.19
140/16	$\det B$	$\det \textcolor{red}{E}$	2023.11.19
144/-2	凸多角形ならば	凸多角形領域ならば	2023.11.02
145/4	凸多角形なので	凸多角形領域なので	2025.04.24
212/4	$Bu + \rho f$	$B\textcolor{red}{v} + \rho f$	2024.04.04
275/-7	$\inf_{x \in X} \frac{\ Tx\ _Y}{\ x\ _X}$	$\inf_{\textcolor{red}{v} \in X} \frac{\ T\textcolor{red}{v}\ _Y}{\ \textcolor{red}{v}\ _X}$	2023.11.04
276/14	$\mathcal{R}(A)$ (2箇所)	$\mathcal{R}(\textcolor{red}{T})$ (2箇所)	2023.11.03
287/-7	$\ p - p_h\ _V$	$\ p - p_h\ _{\textcolor{red}{Q}}$	2023.12.13
302/-6	$C_9\ (u, p)\ _{\mathcal{X}}$	$C_9\ (u, p)\ _{\mathcal{X}}$	2024.01.16
304/6	が成り立つ.	が, 任意の $T \in \mathcal{T}_h$ に対して, 成り立つ.	2023.10.25
304/11	$\ (v, q)\ $	$\ (v, q)\ _{\mathcal{T}_h}$	2024.01.16
305/5	$\inf_{(u_h, p_h) \in \mathcal{X}_h} \sup_{(v_h, q_h) \in \mathcal{X}_h} \frac{B_h((u_h, p_h), (v_h, q_h))}{\ (u_h, p_h)\ _{\mathcal{T}_h} \ (v_h, q_h)\ _{\mathcal{T}_h}}$	$\inf_{(u_h, p_h) \in \mathcal{X}_h} \sup_{(v_h, q_h) \in \mathcal{X}_h} \frac{B_h((u_h, p_h), (v_h, q_h))}{\ (u_h, p_h)\ _{\mathcal{T}_h} \ (v_h, q_h)\ _{\mathcal{T}_h}}$	2024.01.16
329/14	$1 \leq p \leq \infty$	$1 \leq p < \infty$ (2° は 2つの空間が同一視できるという主張です)	2023.12.06

371/6	$\ (A^{-1})^* \mathcal{E}_h(t)^*\ $	$\ \mathcal{E}_h(t)^*(A^{-1})^*\ $	2023.11.05
402/ - 5 ~ -3	このような…通りである。	この一文を削除	2025.04.12
434/ - 9	$\underbrace{\int_{\Omega} [\nabla \cdot (bu)]v \, dx}_{=I}$	$-\underbrace{\int_{\Omega} (bu) \cdot \nabla v \, dx}_{=I}$	2024.01.26
435/2 - 4	$\begin{aligned} I &\approx \sum_{i=1}^{N+B} v_h(P_i) \int_{D_i} \nabla \cdot (b^m u_h) \, dx \\ &= \sum_{i=1}^{N+B} v_h(P_i) \int_{\partial D_i} (b^m \cdot n_i) u_h \, dx \\ &= \sum_{i=1}^{N+B} v_h(P_i) \sum_{j \in \Lambda_i} \int_{\Gamma_{ij}} (b^m \cdot n_{ij}) u_h \, dx \end{aligned}$	$\begin{aligned} I &= \int_{\Omega} [\nabla \cdot (b^m u)]v \, dx - \int_{\Gamma} (b^m \cdot n)uv \, dS \\ &\approx \sum_{i=1}^{N+B} v_h(P_i) \int_{D_i} \nabla \cdot (b^m u_h) \, dx - \sum_{i=N+1}^{N+B} v_h(P_i) \int_{\partial D_i \cap \Gamma} (b^m \cdot n_i)u_h \, dS \\ &= \sum_{i=1}^{N+B} v_h(P_i) \int_{\partial D_i} (b^m \cdot n_i)u_h \, dx - \sum_{i=N+1}^{N+B} v_h(P_i) \int_{\partial D_i \cap \Gamma} (b^m \cdot n_i)u_h \, dS \\ &= \sum_{i=1}^{N+B} v_h(P_i) \sum_{j \in \Lambda_i} \int_{\Gamma_{ij}} (b^m \cdot n_{ij})u_h \, dx \end{aligned}$	2024.01.26
440/6	$r(x, y) = \sqrt{(x - 1/4)^2 + (y - 1/4)^2}$	$r(x, y) = (x - 1/4)^2 + (y - 1/4)^2$	2024.01.26
444/ - 1	質量保存性則	質量保存則 (性を削除)	2023.10.25
450/11	$(Tu, v)_X = (u, T^*v)_Y$	$(Tu, v)_{\textcolor{red}{Y}} = (u, T^*v)_{\textcolor{red}{X}}$	2024.08.09
468/2, 5	$(q, \nabla \cdot v)$	$(q, \nabla \cdot v)_{L^2(\Omega)}$	2024.04.02
472/4	$\lambda \in \mathbb{R}$	$\mu \in \mathbb{R}$	2023.10.25
476/ - 9	$\ Jv_k - Jv_n\ _{2,\Omega}$	$\ Jv_k - Jv_{\textcolor{red}{m}}\ _{2,\Omega}$	2023.10.25
515	[69] Y. Chiba and N. Saito. Nitsche's method for a Robin boundary value problem in a smooth domain. <i>Numer. Methods Partial Differential Equations</i> , 掲載予定	[69] Y. Chiba and N. Saito. Nitsche's method for a Robin boundary value problem in a smooth domain. <i>Numer. Methods Partial Differential Equations</i> , Vol. 39, No. 6, p.p. 4126–4144, 2023.	2024.04.02

535	[390] M. Tabata. A numerical algorithm for an upwind-type finite element method using exponential functions. <i>Theoretical and Applied Mechanics</i> , Vol. 34, pp. 371–376, 1986.	[390] M. Tabata. <i>Conservative upwind finite element approximation and its applications</i> . In <i>Analytical and numerical approaches to asymptotic problems in analysis (Proc. Conf., Univ. Nijmegen, Nijmegen, 1980)</i> , pp. 369–381 North-Holland Math. Stud., 47. Amsterdam-New York, 1981	2023.12.13
539/右-14 ~ -17	Galerkin Least Square (GLS) 安定化 408 Galerkin Least-Square (GLS) 安定化 303	Galerkin Least Square (GLS) 安定化 303, 408	2024.05.10
540/左 - 5	$\mathbb{P}_2/\mathbb{P}_1$	$\mathbb{P}_2/\mathbb{P}_1$ 要素	2023.10.25
540/右 - 4	Taylor-Hood	Taylor-Hood 要素	2023.10.25
544 / - 7	(macro elements)	削除	2023.10.25

— 以上 —